

Тема 1.

Фармацевтическое консультирование потребителей при отпуске ОТС-лекарственных препаратов.

Письменный опрос:

На основании

1. Приказа Минздрава России от 31.08.2016 № 647н «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения» дать определения понятиям:

- Фармацевтическое консультирование;
- Информация, которую фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя;

2. Проекта Приказа Минздрава России «О внесении изменений в надлежащие практики в сфере обращения лекарственных препаратов для медицинского применения» дать определения понятиям:

- Фармацевтическое консультирование.

Проблемно-ситуационная задача:

В аптеку обратилась женщина, желающая приобрести наружную (местную) лекарственную форму для своего сына 7 лет, у которого сильный ушиб ноги, без перелома и нарушения целостности кожных покровов. Никаких препаратов мальчик не применяет. Рецепта нет. Осуществите фармацевтическое консультирование и реализуйте (при возможности) подходящее средство (в том числе с подбором массы лекарственного средства), при условии, что из НПВП в настоящее время в аптеке имеются:

- Долгит (гель 5% 20,0; 50,0)
- Спазгель (гель 2,5% 30,0; 50,0)
- Нимесулид (гель 1% 10,0; 20,0; 30,0)
- Быструмгель (гель 2,5% 30,0; 50,0)
- Артрозилен (гель 5% 30,0; 50,0)
- Фастум, (гель 2,5% 30,0; 50,0)
- Кетонал (гель 2,5% 50,0)
- Нурофен экспресс (гель 5% 50,0; 100,0).

Допускается ли рекомендация ОТС-препарата беременным, если в инструкции к препарату содержится указание, что «препарат может применяться в тех случаях, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка»?

Допускается ли рекомендация ОТС-препарата беременным, если в инструкции к препарату нет указания об использовании препарата беременными?

Выбрать правильный ответ:

Неотложное обращение к врачу требуется в том случае, если у ребенка с лихорадкой имеется:

- одышка, бледность или синюшность кожи, нарушение сознания
- длительный субфебрилитет (более 1-2 недель)
- наличие локальных клинических проявлений со стороны других органов и систем (ЖКТ, мочевыделительная)
- хроническая патология органов кровообращения.

Неотложное обращение к врачу требуется в том случае, если у пожилого посетителя аптеки

- проблемы с памятью
- прогрессирующий дефицит слуха и зрения
- склонность к артериальной гипертензии
- резкое или прогрессирующее похудение.

Неотложное обращение к врачу требуется в том случае, если у посетителя аптеки имеются жалобы на:

- боль различной интенсивности, тупая или острая, с локализацией по ходу межреберных нервов
- боль, жжение, ощущение царапанья в верхних отделах за грудиной при кашле
- боль в груди, внезапно возникшая при физической нагрузке или сопровождаемая одышкой или удушьем
- жжение или ощущение тепла за грудиной, усугубляющееся после приема пищи, в лежачем положении.

Неотложное обращение к врачу требуется в том случае, если у посетителя аптеки имеется:

- изжога, сопровождающаяся прогрессирующей потерей веса
- изжога, присутствующая более 3 месяцев
- изжога, сопровождающаяся одышкой, потоотделением, иррадиацией боли в левую руку, левую сторону шеи, челюсти
- постоянная сильная изжога на протяжении 3 дней и более.

Неотложное обращение к врачу требуется в том случае, если у посетителя аптеки имеется:

- кровохарканье или кровь в мокроте
- кашель, впервые возникший у курильщика старше 45 лет
- кашель длительностью более недели при возрастающей интенсивности
- кашель с отделением густой зеленоватой мокроты.

Неотложное обращение к врачу требуется в том случае, если у посетителя аптеки имеется:

- отек, покраснение, повышение локальной температуры, болезненность суставов
- выраженное поражение суставов, развивающееся на фоне повышенной температуры тела

- быстро нарастающая боль в суставе даже при незначительной нагрузке в сочетании с ограничением его подвижности
- развитие тугоподвижности суставов.